synnerligast i närheten af eller på öarna i Medelhafvet, och vet att dessa fåglar då äro på väg antingen till eller från nordligare belägna områden, måste man inse, att de mest verksamma åtgärderna till deras fredande böra vidtagas just där de små resenärerna efter långa och tröttande färder massvis slå sig ned för att söka föda och njuta en behöflig hvila. Hvilket skydd som hälst, där de under sommaren vistas och häcka, måste bli af föga nytta, om de ej få vara i fred under flyttningstågen.

Det ligger i sakens natur, att befolkningen i de länder, där utrotningskriget äger rum, och hvarest man har en pekuniär fördel af detsamma, ej vill afstå från en sådan inkomstkälla, och det är därför angeläget, att norra och mellersta Europa blifva så väl som möjligt representerade i kommisionen.

Sven Lampa.

Blaps Mucronata Latr. en för Skandinavien ny skalbagge. I Göteborgs tullpackhus har jag tagit denna Heteromer, som egentligen tillhör södra Europa.

Tydligen inkommen med gods utifrån har den sedermera fortplantat sig härstädes och kan väl nu anses bofast, enär jag under 10 års tid tagit flera exemplar årligen och särskildt våren 1888 tjugo exemplar, då packhusgolfvet uppbröts för reparation. Äfven på packhusplatsen har jag påträffat densamma, troligen ute för att uppsöka andra lokaler.

Redtenbachers beskrifning på arten i »Fauna Austriaca» är i öfversättning följande:

Prothorax mycket bredare än lång med rundade sidor, bakåt något afsmalnande, tätt och fint punkterad; sidorna efter längden skrynkliga; de rätvinkliga bakhörnen i spetsen afrundade. Täckvingarna starkt hvälfda, glest punkterade och skrynkliga, med spår af punktstrimmor, baktill utdragna, hos hanen i en lång och smal, hos honan i en kort, trekantig spets. Första bukringen saknar hos båda könen hårborste i midten af bakkanten. L. 22—26 mm.

Alban Nordin.